

TO ARTER, DER HØRER SAMMEN:

# ORANGEBRYSTET SOLBILLE OG HJORTETRØST

Hjortetrøst er god til at tiltrække sommerfugle.

Solbillen er blevet sjælden i Danmark, næsten truet, fordi dens levesteder forsvinder.



Orangebrystet solbille,  
7-9 mm

## ORANGEBRYSTET SOLBILLE

(*Oedemera croceicollis*)

Orangebrystet solbille er en sjælden bille i Danmark. Den er 7-9 mm. Dens latinske navn betyder »*Oedemera*en med den safranfarvede krave«. Den foretrækker at leve på mere eller mindre fugtige enge både med og uden saltpåvirkning. Den lever i, på og af blomstrende urter som hjortetrøst og tidsler.

### KENDETEGN

- Hanner og hunner ligner hinanden i farvefordelingen med rødgul eller orangefarvet forbryst, der er tydelig i kontrast til den sorte krop og hoved med blågrønlige skær. De har store øjne. Forskinneben og forfødder er gulorange.
- **Han:** Lidt slankere end hunnen. Har kraftigere bagben med tykke baglår.
- **Hun:** Lidt bredere end hannen og med spinkle ben.

### FORVEKSLING

Den kan forveksles med træbukken bøgebuk, der dog er mere behåret og ikke har tydelige længdegående striber i dækvingerne.

## HJORTETRØST

(*Eupatorium cannabinum*)

Den vilde hjortetrøst i Danmark kaldes også for hamp-hjortetrøst og er ret almindelig. Udover hjortetrøst findes der flere arter i slægten *Eupatorium*, som kun dyrkes i haver.

Hjortetrøst er 50-150 cm høj. Den gror på lysåbne og gerne fugtig bund ofte ved damme og vandløb.

Bladene er græsgrønne, lancetformede og har en savtakket rand.

De har meget kort stilk.

Stængelen er stiv og næsten hårløs.

Blomsterne sidder i en halvskærm, der består af 4-6 kurve, der igen består af nogle mindre rørformede lyserøde kronblade. Heri dannes en lille aflang nød med en fnok (den lille dusk af tynde hår der sidder på frøet, ligesom på en mælkebøtte).

Planten er ikke spiselig.

### LIVSCYKLUS

- Blomstring finder sted fra juli til september, hvor de bestøves af insekter.
- Nødderne bliver siddende på planten, indtil vinden river dem af, og slynger dem afsted.
- De spredes derfor ikke så langt og ses ofte mange sammen.



Hjortetrøst

## Et orangebrystet solbille-liv

1. Den voksne solbille er klar til at flyve i juni. Varme år ses den allerede i maj.
2. I juni og juli flyver de rundt, og spiser nektar fra skærmplanter.
3. De lægger æg på deres foderplanter, og larverne æder videre på disse planter hen over sommeren. Larven kan både tygge og raspe ligesom en snegl.
4. Larven overvintrer i visse stængler af deres foderplante, typisk i overgangen mellem stængel og rod.
5. Fra midten af maj er larverne færdigudviklede, og de forpupper sig og forvandles til voksne individer.

