

TO ARTER, DER HØRER SAMMEN:

# ENEBÆRBREDTÆGE OG ENE



Enebærbredtæge,  
9-12 mm lang

## ENEBÆRBREDTÆGE

(*Chlorochroa juniperina*)


Enebærbredtægen er en større tæge-art på 9-12 mm. Den kræver enten planten ene eller revling og ynder at suge saft fra disse værtsplanters bær. Derfor findes den kun på heder og hedeagtige levesteder med de to planter.

### KENDETEGN

- **Voksen:** Hanner og hunner ligner hinanden.
- Om foråret og sommeren er den grøn. På oversiden har den en hvid plet og en brun aftegning længst væk fra hovedet. Den er hvidgul hele vejen rundt langs kanten. Antennerne er tofarvet-grønne tættest på hovedet og sort på resten. Benene er grønne.
- Om efteråret og vinteren skifter den fra grøn til brun, de øvrige farvetegninger er de samme.
- **Nymfe** (stadiet efter æg): Den har 5 stadier, hvor den for hvert stadium ligner den voksne mere og mere. Nymfen er grågrøn.

### FORVEKSLING

I vinterdragten kan den voksne nemt forveksles med fyrrebredtægen. I sommerdragten kan den forveksles med den meget almindelige grøn bredtæge.



Der er gode chancer for at se enebærbredtægen på Ulvshale.

Hvis man planter ene i sin have, skal man have både en han- og en hunbusk.

## ENE

(*Juniperus communis*)

Ene er en busk, der i Danmark kan blive op til 10 m høj og et par hundrede år gammel. Den kan se ud på mange måder fra krybende fladt ved jorden til et højt cylindrisk træ. Den kræver meget lys, men kan vokse på de fleste slags jorde.

Ene er en stedsegrøn nåletræsbusk med meget spidse nåle, der sidder på velduftende, rødbrune grene. Der er han- og hunbuske. Da det er et nåletræ, er frugten en kogle, men den ligner et blåt bær. Fuglene spiser bær-koglen, og spreder dermed frøene, der er inde i bær-koglen.

Bær-koglen er spiselig, og kan bruges i fx gryderetter og til snaps.

### LIVSCYKLUS

- I maj og juni blomstrer enebærbuskene, men først når buskene er mere end 15 år.
- Hannens blomster er gule og hunnens grønlig.
- Vinden fører han-blomstens pollen hen til en hun-busk.
- På hun-busken dannes bær-koglen. Det tager to år for den at modne.
- Man finder både første- og andet-års bær på de samme grene.
- Første år er bær-koglen grøn, og i september andet år skifter den farve til mørkeblå.



Enekvist

### Et enebærbredtæge-liv

1. Den voksne enebærbredtæge kan på solrige dage ses allerede i marts, hvor den suger saft på hunblomster af revling og ene.
2. I maj og juni foregår parring og æglægningen. Æggene lægges på både bær og nåle.
3. Nymfen klækker fra ægget i juni-august, hvor den gennemgår de 5 nymfestadier.
4. I slutningen af august er den voksne. Den ses fremme indtil sent på efteråret.
5. Den overvintrer på de tørreste steder i vegetationen under enebærbuskene.