

TO ARTER, DER HØRER SAMMEN:

SORTPLETTET BLÅFUGL OG BREDBLADET TIMIAN



Sortplettet blåfugl,
vingefang 32-40 mm



BREDBLADET TIMIAN

(*Thymus pulegiodes*)

Bredbladet timian er en dværgbusk, der kan blive 30 cm høj. Den lugter af timian. Den hører til læbeblomstfamilien, ligesom fx mynte. Den vokser på varme og lysåbne steder, gerne med kalkrig og nærringsfattig bund som overdrev og bakkeskråninger. Stængelen er tydelig kantet med to brede og to smalle sider. Der er kraftige hår på kanterne. Bladene er glatte og brede.

Blomsterne sidder tæt sammen for enden af stænglerne. Hver blomst består af et bæger, der er grønt og en lyserød krone.

Planten dukker op som krydderi i opskrifter helt tilbage fra 1700-tallet, men har været kendt som krydderurt siden tidlig middelalder. Den har også været brugt som urtemedicin.

LIVSCYKLUS

- Planten er flerårig.
- Blomstrer fra sidst i juni til august.
- Blomsten bestøves af insekter.
- Hver lille blomst danner en kapsel med mange frø i. De modnes fra august til september.



Bredbladet timian

SORTPLETTET BLÅFUGL

(*Phengaris arion*)


Sortplettet blåfugl er én af Danmarks 24 arter fra blåfuglefamilien, hvoraf kun 10 er almindelige. Arten findes ved varme, blomsterrige overdrev, ofte ved kyster med stor udbredelse af timian eller merian samt tuer af hedestikmyren. Den er blevet yderst sjælden i Danmark. Siden 2013 er den kun fundet på Høvblege på Østmøn.

KENDETEGN

- **Voksne:** Hanner og hunner ligner hinanden meget. Hannen har som regel lidt mindre sorte pletter. De har et vingefang på 32-40 mm. Oversiden af vingerne er grålig til blå. På forvingen ses sorte pletter, der ofte er dråbeformede. Undersiden har større sorte øjepletter og er brunlig.
- **Larve:** Fra ægget kommer en 2-3 mm lang, rødviolet larve frem. Senere bliver den lyserød til hvidgul og op til 10-12 mm.

FORVEKSLING

De voksne kan forveksles med andre sommerfugle fra blåfuglfamilien.



Et sortplettet blåfugl-liv

1. De voksne ses fra midt juni til august. Den enkelte sommerfugl er fremme en uge.
2. Parringen foregår hurtigt, så æglægningen kan begynde.
3. Æggene er hvide og ovale. De lægges i blomsterne på timian.
4. Efter et par døgn klækker ægget, og larven spiser af blomsten. Er der flere larver i blomsten, kan de spise hinanden.
5. Larven udskiller feromoner og honningdug, som tiltrækker hedestikmyren. Når larven falder af blomsten, tager myren larven med ned i myretuen.
6. I myretuen æder blåfuglens larve myrelarverne. Den kan spise 1.000 larver, mens den vokser sig stor.
7. I løbet af efteråret forpupper den sig.
8. Puppen klækkes midt i juni, herefter kravler den voksne sommerfugl op af myretuen og pumper vingerne op.